


日水研報告, (13) : 131-132, 1964.
Bull. Jap. Sea Reg. Fish. Res. Lab., (13) : 131-132, 1964.

日本海ではじめて採集されたアカモアミ¹

小 川 良 徳

アカモアミ *Paracanthomysis hispida* II は伊井(1936)によつて記載され、産地として青森県大間、神奈川県三崎、朝鮮釜山等が知られている。しかし、本邦日本海沿岸での採集記録はまだなかつた。最近、



第1図 香住産アカモアミ (1962年5月6日採集) A……♀ B……♂

¹ YOSHINORI OGAWA: A new record of *Paracanthomysis hispida* II from the Japan Sea.

兵庫県北部の香住海岸で本種を採集したので、新産地として報告する。

筆者は1962年5月6日と1963年11月23日に、兵庫県香住港防波堤付近の水深50~70cm程度の岩礁のくぼみのアオサ群落のなかに群泳していたものをタモ網でくつた。

伊井博士からの私信によると本種は神奈川県三崎東大臨海実験所付近の海藻中にも多く産し、体色は鮮紅色のものが多いという。筆者の採集した香住産の体色は黄茶色であり、鮮紅色の個体はまったく認められなかつた。

5月採集標本では大部分の雌の保育囊に卵および種々の発育段階の幼生がみられた。11月採集標本では保育囊は判然としなかつた。

御教示と種の同定の労を賜つた彦根市伊井直愛博士に厚くお礼を申し上げる。

文 献

II N. (1936). Studies on Japanese Mysidacea
II. Description of three new species belonging
to two new genera, *Parastilo-mysis* and
Paracanthomysis. *Jap. Jour. Zool.*, 7 (1) : 1-11.